

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA**

LÍVIA PAGOTTO RODRIGUES

**“LESÃO DE MANCHA BRANCA AO REDOR DE DISPOSITIVOS
ORTODÔNTICOS: ETIOLOGIA, DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E
PREVENÇÃO”**

**PIRACICABA
2015**

LÍVIA PAGOTTO RODRIGUES

**“LESÃO DE MANCHA BRANCA AO REDOR DE DISPOSITIVOS
ORTODÔNTICOS: ETIOLOGIA, DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E
PREVENÇÃO”**

Monografia apresentada à Faculdade de
Odontologia de Piracicaba da Universidade
Estadual de Campinas como requisito para
obtenção de Título de Especialista em Saúde
Coletiva e da Família.

Orientadora: Prof^a. Jaqueline Vilela Bulgareli

**PIRACICABA
2015**

Ficha catalográfica
Universidade Estadual de Campinas
Biblioteca da Faculdade de Odontologia de Piracicaba
Marilene Girello - CRB 8/6159

R618L Rodrigues, Livia Pagotto, 1986-
Lesão de mancha branca ao redor de bráquetes ortodônticos : etiologia, tratamento e prevenção / Livia Pagotto Rodrigues. – Piracicaba, SP : [s.n.], 2015.

Orientador: Jaqueline Vilela Bulgareli.

Trabalho de Conclusão de Curso (especialização) – Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Odontologia de Piracicaba.

1. Prevenção. 2. Desmineralização. I. Bulgareli, Jaqueline Vilela, 1980-. II. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Odontologia de Piracicaba. III. Título.

Informações adicionais, complementares

Título em outro idioma: White spot lesion around orthodontic brackets: etiology, treatment and prevention

Palavras-chave em inglês:

Prevention

Demineralization

Área de concentração: Saúde Coletiva e da Família

Titulação: Especialista

Data de entrega do trabalho definitivo: 20-08-2015

DEDICATÓRIA

A Deus,

Pela vida e pelas preciosidades em minha vida. Também, à Espiritualidade Amiga, auxiliadora nos momentos de aflições. A Eles, meu eterno agradecimento...

*Aos amores de minha vida: **José Antônio, Ana Rúbia, Leonardo e Guilherme.** Ainda, aos novos amores que entraram em meu caminho: **Fabiana, Marília e João Gabriel.***

Exemplos de honestidade e caráter. Ainda distantes, pelas escolhas momentâneas da vida, mas sempre presentes em cada momento de minha vida. Anjos intitulados de “família”. Amo vocês.

AGRADECIMENTOS

À Universidade Estadual de Campinas, na pessoa do seu Magnífico Reitor **Prof. Dr. José Tadeu Jorge**; à Faculdade de Odontologia de Piracicaba, na pessoa do seu Diretor **Prof. Dr. Guilherme Elias Pessanha Henriques** e Diretor Associado **Prof. Dr. Francisco Haiter Neto**. Ao coordenador do curso de especialização em Saúde Coletiva e da Família **Prof. Dr. Antonio Carlos Pereira**. Aos demais professores do curso, em especial à **Profa. Jaqueline Vilela Bulgareli**, pela orientação da monografia, de maneira muito gentil e atenciosa.

Aos **funcionários da Escola de Extensão da UNICAMP – EXTECAMP** pela atenção e apoio durante as fases administrativas.

Aos **amigos e companheiros do curso** de especialização em Saúde Coletiva e da Família, pelos agradáveis momentos em aulas e atividades do curso.

A todos os **funcionários** da Faculdade de Odontologia de Piracicaba pela colaboração e convivência.

A vocês, os meus sinceros agradecimentos...

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	09
CAPÍTULO: Odontologia Preventiva em Pacientes Ortodônticos - Como prevenir e tratar as lesões de mancha branca?	10
CONCLUSÃO GERAL	30
REFERÊNCIAS	31

RESUMO

O tratamento ortodôntico (TO) envolve a colagem de dispositivos no esmalte dental, que aumentam o risco ao desenvolvimento de lesões de mancha branca (LMB) por desmineralização. Estas são consideradas um dos maiores problemas de relevância clínica, uma vez que compromete o resultado final do TO e acomete aproximadamente 50% dos pacientes. A literatura é vasta a respeito dos métodos preventivos e tratamentos da desmineralização ao redor de dispositivos ortodônticos, podendo ser citados a educação em saúde bucal do paciente ortodôntico, administração de agentes fluoretados durante o tratamento e alguns tipos de laser. O objetivo deste estudo foi a realização de uma revisão narrativa da literatura sobre a etiologia, o tratamento e a prevenção das lesões de mancha branca em pacientes ortodônticos. Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, realizado por meio de um levantamento nas bases eletrônicas de domínio público Lilacs, MEDLINE e SciELO. Os critérios adotados para seleção dos artigos foram: todas as categorias de artigo (original, revisão de literatura, reflexão, atualização e relatos de casos clínicos), artigos com resumos e textos completos disponíveis para análise, publicados nos idiomas português, inglês e espanhol que abordassem a temática. Os descritores em ciências da saúde (DeCS) escolhidos foram: cárie, lesão de mancha branca e aparelho ortodôntico.

Palavras-chave: Prevenção, Desmineralização, Lesão de Mancha Branca, Dispositivos Ortodônticos.

ABSTRACT

Orthodontic treatment (OT) involves bonding device in the dental enamel, which increases the risk to the development of white spot lesions (LMB) by demineralization. These are considered one of the greatest problems of clinical relevance since they compromise the final result of the OT and affects approximately 50% of patients. The literature is extensive regarding prevention methods and treatments of demineralization around orthodontic appliances, like education in oral health orthodontic patient, fluoride agents given during treatment and some types of laser. The objective of this study was to conduct a narrative review of the literature about the etiology, treatment and prevention of white spot lesions in orthodontic patients. It is a descriptive and exploratory study, conducted through a survey in the electronic databases of public domain Lilacs, MEDLINE and SciELO. The criteria adopted to select the articles were: all categories of article (original, literature review, reflection, update and case reports), articles with abstracts and full text available for analysis, published in Portuguese, English and Spanish that addressed the issue. The descriptors in health sciences chosen were: decay, white spot lesions and braces.

Keywords: Prevention, Demineralization, White Spot Lesion, Orthodontic Appliances

INTRODUÇÃO GERAL

Nas últimas três décadas a Ortodontia se popularizou, expandindo seus limites de atuação, e assim, sendo possível beneficiar quase todos os pacientes com necessidades relacionadas à movimentação dentária (Consolaro, 2006). Entretanto, muitos pacientes com higiene bucal deficiente podem desenvolver lesões de mancha branca, que são áreas de desmineralização do esmalte. Este achado clínico tem sido apontado como um dos riscos do tratamento ortodôntico. (Gorelick *et al.*, 1982; Mizrahi, 1982; Ogaard *et al.*, 1989, Ogaard 1992).

A lesão de mancha branca é considerada a precursora da lesão de cárie cavitada (Darling, 1956), e é atribuída ao acúmulo prolongado e retenção do biofilme dental na superfície do esmalte adjacente ao dispositivo ortodôntico (Zachrisson & Zachrisson, 1971). Frequentemente, isso ocorre pela dificuldade de higienização das superfícies dentais onde os dispositivos ortodônticos estão colados. Com o acúmulo de biofilme na superfície dental, inicia-se o processo de desmineralização do esmalte e assim, o desenvolvimento dessas lesões, podendo ocorrer em apenas algumas semanas após a instalação do aparelho.

A presença das lesões de mancha branca após a remoção do dispositivo ortodôntico tem sido um acontecimento frequente que preocupa a especialidade, visto que um dos objetivos da área é a estética dentária. A identificação dos pacientes sob maior risco de desenvolvimento dessas lesões e a prevenção tem sido uma preocupação constante do ortodontista. (Gorelick *et al.*, 1982; Artun & Brobakken, 1986; Øgaard, 1989; Sudjalim, 2006).

CAPÍTULO 1

Odontologia Preventiva em Pacientes Ortodônticos - Como prevenir e tratar as lesões de mancha branca?

Lívia Pagotto Rodrigues¹

Bruna Raquel Zancopé¹

Pablo Guilherme Caldarelli¹

Jaqueline Vilela Bulgareli¹

¹Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Universidade Estadual de Campinas, Piracicaba, SP, Brasil

Autor de correspondência:

Jaqueline Vilela Bulgareli

Av. Limeira, 901, Piracicaba, SP

13414-903, Brasil

Telefone: #55-19-21065200

Email: jaquelinebulgareli@gmail.com

RESUMO

Os problemas de maloclusão são considerados como o terceiro maior problema de saúde pública pela Organização Mundial de Saúde e a busca pela correção de desvios morfológicos da oclusão normal tem feito com que a procura por tratamento ortodôntico seja cada vez maior. Entretanto, um dos maiores problemas relacionados ao uso de dispositivos ortodônticos tem sido o desenvolvimento de lesões de mancha branca, que é considerada como a precursora da lesão de cárie cavitada e deve ser corretamente diagnosticada e prevenida. Assim, o presente estudo tem como objetivo realizar uma revisão narrativa da literatura sobre a etiologia, o tratamento e a prevenção das lesões de mancha branca em pacientes ortodônticos. Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, realizado por meio de um levantamento em bases eletrônicas de domínio público. Concluiu-se que a colaboração do paciente e o uso de bochecho com solução de fluoreto de sódio a 0,05% torna-se uma associação terapêutica de sucesso, permitindo que o resultado final do tratamento seja satisfatório em termos funcionais, estéticos e de promoção da saúde bucal.

Palavras-chave: Prevenção, Desmineralização, Lesão de Mancha Branca, Dispositivos Ortodônticos.

ABSTRACT

Malocclusion problems are considered as the third bigger public health problem by the World Health Organization and the search for correction of morphological deviations from normal occlusion has caused the increasing on demand for orthodontic treatment. However, a major problem related to the use of orthodontic appliances has been the development of white spot lesions. It is considered as the precursor of the cavitated caries lesion and must be correctly diagnosed and prevented. Thus, the aim of this study is to conduct a narrative review of the literature about the etiology, treatment and prevention of white spot lesions in orthodontic patients. It is a descriptive and exploratory study, conducted through a survey in electronic databases in the public domain. It was concluded that the cooperation of the patient and the use of mouthwash with sodium fluoride 0.05% solution becomes a combination therapy of success, allowing the final outcome be satisfactory in terms of functional, aesthetic and promotion oral health.

Keywords: Prevention, Demineralization, White Spot Lesion, Orthodontic Appliances

INTRODUÇÃO

Com a popularização da Ortodontia nas últimas três décadas, muitos pacientes estão sendo beneficiados com o tratamento ortodôntico (Consolaro, 2006). A razão principal que motiva a maioria dos pacientes a procurarem por esse tratamento é a busca por estética, seguida pelas indicações médicas e odontológicas (Ackerman, 2010). Entretanto, um dos efeitos adversos do uso de aparelhos ortodônticos fixos é o acúmulo de biofilme dental ao redor dos dispositivos colados ao dente, que está associado com o risco aumentado de desenvolvimento de lesões de manchas brancas (Tufekci *et al.*, 2011). Este achado clínico é apontado como um dos riscos do tratamento ortodôntico (Gorelick *et al.*, 1982; Øgaard *et al.*, 1989, Van Der Linden & Dermaut, 1998; van der Kaaij *et al.*, 2015). Neste contexto, as lesões de manchas brancas associadas ao uso do aparelho ortodôntico fixo têm sido relatadas como um dos maiores problemas de relevância clínica, (Gorelick *et al.*, 1982; Kukleva *et al.*, 2002; Gorton & Featherstone, 2003; Zimmer & Rottwinkel, 2004; Lovrov *et al.*, 2007; Richter *et al.*, 2011; Al Maaitah *et al.*, 2011), as quais acometem aproximadamente 50% dos pacientes em tratamento ortodôntico (Tufekci *et al.*, 2011). Este impacto clínico se deve ao fato de que a lesão de mancha branca é considerada como a precursora da lesão de cárie cavitada (Darling, 1956; O'Reilly & Featherstone, 1987), podendo também ser considerada um problema estético relevante.

Além disso, as lesões de manchas brancas são uma complicação comum decorrente de higiene oral deficiente pela dificuldade de limpeza das superfícies dentais em virtude da presença dos dispositivos ortodônticos e gera percepções negativas quanto ao resultado final do tratamento (Maxfield *et al.*, 2012) tendo em vista que a terapia ortodôntica tem como finalidade não apenas a oclusão funcional, mas também harmonia, estética e saúde da cavidade bucal. Assim, o sucesso do tratamento ortodôntico é relacionado à correção da oclusão de maneira satisfatória, sem, contudo, alterar a higidez pré-existente dos dentes e

tecidos de suporte, por meio da aplicação de um modelo de programa educativo-preventivo individualizado a cada paciente, que considere os fatores de risco à cárie dentária, doença periodontal e seu potencial de colaboração com as medidas empregadas (Olympio *et al.*, 2006). Prevenir a formação das lesões de mancha branca decorrentes do tratamento ortodôntico deve ser uma preocupação constante do ortodontista.

Assim, o objetivo deste trabalho é realizar uma revisão da literatura acerca da etiologia da lesão de mancha branca, bem como de estratégias preventivas, métodos de tratamento dessas lesões ao redor de dispositivos ortodônticos e seus impactos no resultado final do tratamento.

Material e Métodos

Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, no qual a estratégia de identificação e seleção dos estudos foi levantamento bibliográfico de publicações indexadas em bases eletrônicas de dados: Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), MEDLINE (Medical Literature and Retrieval System on Line) e SciELO (Scientific Electronic Library Online). Foram adotados os seguintes critérios para seleção dos artigos: todas as categorias de artigo (original, revisão de literatura, reflexão, atualização e relatos de casos clínicos), artigos com resumos e textos completos disponíveis para análise, publicados nos idiomas português, inglês e espanhol que abordassem a temática. Não foi realizada a inclusão do filtro relacionado à data das publicações, uma vez que existem estudos pioneiros na área, que são considerados um marco para as pesquisas seguintes e que foram incluídos, além dos artigos encontrados pelas ferramentas de busca citados.

Foram selecionados os artigos que continham em seus títulos e/ou resumos os seguintes descritores em ciências da saúde (DeCS): aparelho ortodôntico, lesão de mancha branca e cárie. Após, procedeu-se à leitura minuciosa de cada artigo científico, destacando

aqueles que responderam aos objetivos propostos por este estudo. Para isso, foi elaborado um instrumento de coleta de dados contendo título do artigo científico, título do periódico, ano de publicação, país do estudo, categoria do estudo, natureza do estudo, referencial teórico, método de análise, objetivo e resultados encontrados. Ao todo, foram encontrados 18 artigos, seguindo os critérios previamente estabelecidos. Foram excluídos artigos cuja metodologia foi considerada distante da proposta deste estudo.




Figura 1: Diagrama ilustrando a metodologia utilizada na busca bibliográfica

REVISÃO DE LITERATURA

ETIOLOGIA DAS LESÕES DE MANCHAS BRANCAS POR DESMINERALIZAÇÃO

Um dos maiores problemas relacionados ao uso de dispositivos ortodônticos tem sido o desenvolvimento de lesões de mancha branca, que é considerada como a precursora da lesão de cárie cavitada e deve ser corretamente diagnosticada e prevenida (Darling, 1956; O'Reilly & Featherstone, 1987). Sabe-se que o desenvolvimento de uma lesão de cárie é um processo dinâmico, sendo caracterizado por períodos alternados de desmineralização e remineralização, que ocorrem constantemente entre os tecidos dentários e os fluidos do meio bucal (Cury, 2001; Featherstone, 2004). Constantemente há trocas minerais, e estas são influenciadas pelas condições que mantêm um pH crítico na cavidade bucal. Ou seja, desde que seja mantido na cavidade bucal pH maior que 5,5, haverá condição de supersaturação da saliva, que contém cálcio (Ca) e fosfato (P), superando o produto de solubilidade da hidroxiapatita (HA). Assim, a tendência físico-química é o ganho de minerais pelo tecido dental, oriundos do meio-bucal. Conceitua-se o pH de 5,5 como pH crítico, pois este é o limite do produto iônico das concentrações de Ca e P na saliva, que favorece o equilíbrio entre o processo de des-remineralização (Cury, 2001).

Quando o pH na cavidade bucal é menor que 5,5, a composição da saliva em relação ao Ca e P torna-se inferior (subsaturante) em relação ao produto de solubilidade da HA, e, deste modo, a tendência físico-química é a perda de íons Ca e P do esmalte para o meio bucal, na tentativa de atingir o novo estado de equilíbrio em função do pH atingido. A queda do pH no biofilme dental ocorre após ingestão de carboidratos solúveis (sacarose), ocorrendo como consequência a dissolução do esmalte (Fejerskov *et al.*, 2003).

A lesão de cárie é o sinal clínico do desequilíbrio do processo des-remineralização, quando há predominância da perda mineral do esmalte e da dentina, sendo

definida como resultado da dissolução química dos tecidos duros do dente, provocada por ácidos provenientes do consumo de açúcar com baixo peso molecular. Pode ser classificada desde o início da perda mineral, podendo se estender até a destruição total do dente (Pitts, 2004). Segundo Lussi *et al.* (1999), quando em estágio inicial, a lesão de cárie pode ser totalmente remineralizada e isto enfatiza a necessidade do aperfeiçoamento de métodos preventivos que possam agir como coadjuvantes na prevenção e controle da cárie dentária em pacientes ortodônticos.

Os dispositivos criam novas áreas de retenção para a formação de biofilme, cujo acúmulo, na presença de açúcares da dieta poderia resultar em um aumento do número e porcentagem de espécies cariogênicas, como *Streptococcus mutans* e *Lactobacillus* (Gorelick *et al.*, 1982; O'Reilly & Featherstone, 1987). O aumento da população de bactérias cariogênicas pode levar a uma queda no pH, que altera o balanço do equilíbrio dos processos de desmineralização-remineralização, levando assim, à perda de minerais, que pode acarretar no desenvolvimento de manchas brancas e, eventualmente, cavitação, podendo se estender até a dentina. Em casos mais severos pode haver a necessidade de tratamento restaurador destas lesões, quando cavitadas. A porcentagem de pacientes que desenvolvem lesões de mancha branca decorrentes do tratamento ortodôntico é citada em trabalhos na literatura como variando em torno de 50% (Gorelick *et al.*, 1982; Banks *et al.*, 1997; Boersma *et al.*, 2005; Øgaard *et al.*, 2001, Basdra *et al.*, 1996).

As lesões de mancha branca comprometem a estética dentária, podendo ocorrer por cárie incipiente, opacidades do esmalte ou hipoplasia do esmalte. Nessas situações, há uma diminuição do conteúdo mineral e modificação da organização estrutural, havendo assim um aumento do conteúdo orgânico do esmalte, o que promove a redução da resistência física do tecido (Consolaro & Consolaro, 2006). A aparência é causada por um fenômeno óptico

devido à perda de minerais e substituição do conteúdo orgânico da subsuperfície por ar, assim, quando da secagem exagerada, evidencia-se a mancha (Gorelick *et al.*, 1982).

Chang *et al.* (1997) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar a etiologia e prevenção da desmineralização do esmalte durante o tratamento ortodôntico. Estes autores citam fatores etiológicos gerais da cárie dentária, como: os fatores microbianos, fatores salivares, o fluxo salivar, o pH e a capacidade tampão da saliva, a higiene bucal e a dieta. Dentre os fatores etiológicos mais específicos em relação ao tratamento ortodôntico, os a própria influência da presença do dispositivo ortodôntico fixo gera uma área de estagnação, favorecendo o acúmulo de biofilme e servindo como uma fonte de produção de ácidos na presença de substratos alimentares (Chang *et al.*, 1997; Martin *et al.*, 2010).

MEIOS PREVENTIVOS

A literatura é vasta a respeito dos métodos preventivos ao desenvolvimento de áreas de desmineralização ao redor de dispositivos ortodônticos, podendo ser citados a educação em saúde bucal do paciente ortodôntico, administração de agentes fluoretados e uso de materiais de colagem liberadores de fluoreto, durante o tratamento (Marcusson *et al.*, 1997; Miwa *et al.*, 2001; Cohen *et al.*, 2003; Benson *et al.*, 2005; Korbmacher *et al.*, 2006; Øgaard *et al.*, 2006; Olympio *et al.*, 2006; Rohilla *et al.*, 2009; Nalbantgil *et al.*, 2013).

- **Agentes fluoretados**

Vários autores sugeriram métodos preventivos para prevenir a desmineralização ao redor dos dispositivos ortodônticos, sendo citados a constante instrução de higiene bucal e o uso de bochechos fluoretados. O uso de fluoretos é um recurso importante na prevenção da desmineralização do esmalte e atualmente, há várias formas de uso deste composto durante o tratamento ortodôntico, incluindo o uso de dentifrícios, bochechos, géis, vernizes e materiais

liberadores de flúor, tais como adesivos e elásticos (Benson *et al.*, 2005; Rogers *et al.*, 2010; Ulkur *et al.*, 2014).

O'Reilly & Featherstone (1987), em um estudo clínico, objetivaram quantificar e avaliar a extensão da desmineralização ao redor de dispositivos ortodônticos após um mês de uso do aparelho na boca e também, avaliar a habilidade de produtos à base de fluoretos disponíveis no mercado de inibir ou reverter o processo de desmineralização. O estudo mostrou forte evidência da efetividade da combinação do uso de dentifrício fluoretado diariamente associado com o uso de bochecho fluoretado (0,05% de fluoreto de sódio) contra o processo de desmineralização e promoção da remineralização quando do emprego contínuo desses dois métodos de uso do fluoreto.

Em 1988, Geiger *et al.* realizaram um estudo clínico para verificar se a frequência de bochechos com fluoreto de sódio 0,05% influenciava na formação de lesões de mancha branca no esmalte de pacientes que utilizavam bráquetes ortodônticos. Concluiu-se que redução significativa de lesões de manchas brancas no esmalte pode ser alcançada durante o tratamento ortodôntico através do uso de 10mL de solução para bochecho à base de fluoreto de sódio a 0,05%.

Heintze, em 1996, afirmou que o flúor não deve ser considerado apenas como uma substância preventiva contra a doença cárie, mas também, uma substância terapêutica que pode ser um agente auxiliar no processo de remineralização das lesões. O autor sugere ainda, que o ortodontista não deve confiar apenas no uso de bochechos fluoretados, embora estudos controlados comprovem que a incidência de manchas brancas pode ser reduzida com os mesmos. Heintze (1996) conclui que seria melhor utilizar vernizes de flúor que podem ser aplicados nas superfícies que apresentam maior risco à desmineralização, três ou mais vezes por ano, dependendo do grau de risco à doença. Adicionalmente, o trabalho sugere que deve

ser aplicado verniz fluoretado nas superfícies dentais, tanto antes da colocação das bandas ortodônticas, quanto durante o tratamento e na remoção dos acessórios.

Chang *et al.* (1997) relataram que alguns estudos têm concluído que apenas o dentifrício fluoretado não tem sido suficiente para evitar o aparecimento das lesões de mancha branca em pacientes ortodônticos e que seria necessária a suplementação com o uso de bochechos diários e/ou uso de selantes em superfícies suscetíveis ao desenvolvimento de lesões de mancha branca, antes da colagem dos bráquetes.

Segundo Cury (2001), atualmente há um consenso de que o flúor importante é aquele mantido constante na cavidade bucal, o qual é capaz de interferir na dinâmica do processo de cárie, reduzindo a quantidade de minerais perdidos durante o processo de desmineralização e ativando a quantidade de resposta durante a remineralização salivar.

Benson *et al.* (2005), em uma revisão sistemática de literatura, objetivaram avaliar a efetividade dos fluoretos na prevenção da ocorrência de lesões de mancha branca em pacientes ortodônticos. Os autores avaliaram estudos que utilizaram diversas formas de uso de fluoretos e encontraram evidência de que o uso diário de bochecho fluoretado é capaz de reduzir a severidade da desmineralização. Baseados nos estudos avaliados, os autores sugerem que a melhor opção de recomendação de uso de fluoretos como método preventivo seria o uso de bochechos diários contendo fluoreto de sódio a 0,05%.

- **Materiais de colagem liberadores de fluoreto**

O procedimento de colagem em esmalte dental baseia-se em alterações morfológicas ocorridas no esmalte em decorrência da ação de tratamentos superficiais propostos inicialmente por Buonocore (1955). O autor verificou que a ação de substâncias ácidas sobre a estrutura mineral possibilita a retenção micromecânica de materiais resinosos ao esmalte dental previamente condicionado. Tal descoberta também foi empregada na

Ortodontia, promovendo grandes benefícios clínicos, uma vez que este mecanismo de união permanece sendo usado quando na colagem de acessórios ortodônticos.

Berto *et al.* (1991) analisaram o comportamento clínico da cimentação de bráquetes com ionômero de vidro (SHOFU 1), por um período de até 18 meses. Para isso, os acessórios ortodônticos foram colados em 80 dentes de 10 pacientes com idades compreendidas entre 14 e 17 anos. A manipulação do material de colagem foi realizada seguindo-se as recomendações do fabricante. Após quatro meses do início do estudo, os autores observaram que dez bráquetes haviam se soltado, sendo necessário, portanto, nova cimentação do acessório, com o mesmo material previamente utilizado. Oito acessórios se soltaram após 13 meses de avaliação e, após 17 meses, apenas um bráquete. Os autores concluíram que o cimento de ionômero de vidro SHOFU I mostrou-se eficiente na colagem de bráquetes ortodônticos. O material empregado no estudo mostrou-se capaz de prevenir o desenvolvimento de desmineralização do esmalte ao redor de bráquetes ortodônticos, comumente observada ao fim do tratamento ortodôntico.

Øgaard *et al.* (1992) objetivaram avaliar *in vivo* o potencial cariostático de um adesivo fotoativável utilizado para a colagem de bráquetes ortodônticos. A liberação de flúor do material foi avaliada tanto em água quanto em saliva. Dez voluntários possuindo pré-molares indicados para a extração participaram do estudo. Foram avaliados os materiais Heliosit-Orthodontic (Vivadent, Liechtenstein), não liberador de flúor, e o cimento ortodôntico VP 862 (Vivadent, Liechtenstein), que apresenta uma liberação de flúor lenta. Os voluntários foram instruídos a utilizar dentifrício fluoretado durante o experimento. Após quatro semanas de estudo, os dentes previamente selecionados foram extraídos e o conteúdo mineral do esmalte ao redor dos bráquetes foi avaliado por microrradiografia. A liberação de flúor de discos confeccionados em laboratório com o material adesivo liberador de flúor foi avaliada em água, após um período de seis meses e em saliva, após um período de 24 horas. O

material liberador de flúor reduziu a profundidade da lesão em 48% em relação ao adesivo não liberador de flúor. A maior liberação de flúor do material em água foi observada na primeira semana, entretanto, uma quantidade significativa de flúor ainda era liberada mesmo após os seis meses de experimento. A liberação de flúor foi significativamente menor em saliva humana em um pH sete do que em água, entretanto, quando o pH salivar atingia um valor inferior a quatro, mimetizando um desafio cariogênico, essa quantidade de flúor aumentava, se assemelhando aos valores observados em água. Como conclusão do estudo, os autores afirmam que a liberação de flúor é pH dependente e ainda, que o uso regular de dentifrício fluoretado é insuficiente para inibir o desenvolvimento de lesões de mancha branca ao redor de bráquetes ortodônticos.

Gorton & Featherstone (2003) em um estudo *in vivo*, realizaram uma análise quantitativa dos efeitos do cimento de ionômero de vidro sobre os dentes com bráquetes ortodônticos, que tinham indicação de extração por razões ortodônticas. Para isso, eles avaliaram a porcentagem de perda mineral, que foi calculada baseada no quanto de desmineralização houve e ainda, avaliaram as concentrações de flúor de amostras de saliva coletadas dos pacientes. Os voluntários foram instruídos a escovar seus dentes duas vezes ao dia com um dentifrício fluoretado (1100ppm F). Como material não liberador de flúor, os autores utilizaram a resina Transbond XT (3M Unitek, Monrovia). Ao final de quatro semanas de experimento, os dentes previamente selecionados foram extraídos e armazenados em solução de timol a 0,1%. Posteriormente, foi realizada a análise de microdureza longitudinal, seguindo o padrão em V. Os resultados de microdureza mostraram que houve significativamente maior desmineralização ao redor dos bráquetes do grupo que utilizou o material de colagem não liberador de flúor. Em relação à análise salivar, oito amostras foram coletadas de cada paciente ao longo das quatro semanas, não havendo diferença significativa entre os grupos testados quanto à concentração de flúor na saliva.

Pascotto *et al.* (2004) avaliaram *in vivo* o efeito do cimento de ionômero de vidro na redução da desmineralização ao redor de bráquetes ortodônticos. Para o estudo, 14 voluntários foram selecionados e randomicamente divididos em 2 grupos, sendo que 7 tiveram bráquetes colados aos pré-molares com a resina Concise (3M Produtos, St Paul, Minn) sendo este o grupo controle, e outros 7 voluntários tiveram os bráquetes colados com Fuji Ortho LC (GC American, Chicago III), um cimento de ionômero de vidro modificado por resina, sendo este o grupo experimental. Após 30 dias de experimento, os voluntários tiveram os pré-molares extraídos. Os dentes foram seccionados e avaliados por análise de microdureza longitudinal. Os autores concluíram ao final do estudo que o uso do cimento de ionômero de vidro para colagem de bráquetes foi estatisticamente mais significativa em relação à diminuição da desmineralização ao redor dos dispositivos ortodônticos. Assim, os autores encorajam o uso do cimento de ionômero de vidro como material de colagem.

Benson *et al.* (2005), concluíram que o emprego de cimentos de ionômero de vidro para colagem de dispositivos ortodônticos reduz a ocorrência de lesões de mancha branca, quando comparados às resinas compostas.

Rogers *et al.* (2010), realizaram uma revisão de literatura sistemática objetivando avaliar a efetividade de materiais adesivos contendo flúor no controle da desmineralização do esmalte dentário em pacientes em tratamento ortodôntico. Os autores encontraram evidência de que o uso do cimento de ionômero de vidro como material adesivo é mais efetivo em prevenir a desmineralização durante o tratamento ortodôntico, em relação às resinas compostas convencionais. Entretanto, devido às limitações de adesão do ionômero, o mesmo não pode ser recomendado. Ainda, os autores concluíram que mais estudos são necessários para avaliar a efetividade dos materiais adesivos que contêm flúor. Assim, os autores concluíram que o cimento de ionômero de vidro foi capaz de reduzir significativamente a

desmineralização ao redor dos bráquetes ortodônticos, no período de quatro semanas de avaliação.

DISCUSSÃO

Ainda que existam avanços em relação aos materiais e técnicas disponíveis na Ortodontia, a prevalência das lesões de manchas brancas em pacientes ortodônticos continua elevada, em torno de 50% (Gorelick *et al.*, 1982; Banks *et al.*, 1997; Boersma *et al.*, 2005; Øgaard *et al.*, 2001; Basdra *et al.*, 1996). Assim, prevenir a ocorrência dessas lesões é um assunto de extrema importância.

A literatura é unânime em relação às terapias com flúor que combinam dentifrícios e bochechos fluoretados e aplicação profissional de flúor. Essas têm se mostrado eficazes em prevenir ou reduzir as lesões de manchas brancas em pacientes com aparelho ortodôntico (Nalbantgil *et al.*, 2013; Benson *et al.*, 2005; Cohen *et al.*, 2003). No entanto, esse é um tratamento que apresenta baixo índice de cooperação por parte dos pacientes, o que compromete sua efetividade (Geiger *et al.*, 1992; Shannon, 1981), e o efeito do flúor é parcial já que o mesmo não consegue impedir completamente o desenvolvimento das lesões de cárie (Geiger *et al.*, 1992). Adicionalmente, as recomendações aos pacientes devem incluir instrução de higiene bucal, reforço e controle da mesma, sempre que possível (Sudjalim *et al.*, 2006).

Clinicamente, as lesões de manchas brancas com profundidade de 75 µm podem ser desenvolvidas no período de apenas quatro semanas, o que implica dizer que a aplicação tópica de flúor deve ser mantida durante todo o tratamento, porém, normalmente isso não ocorre na clínica (Øgaard, 1989). Assim, os fabricantes incorporaram flúor aos materiais de

colagem ortodôntica com o objetivo de ajudar a prevenir a desmineralização do esmalte dental ao redor dos bráquetes (Banks *et al.*, 1997; Vorhies *et al.*, 1998).

Materiais adesivos que apresentam liberação lenta de flúor promovem redução e até mesmo inibição do processo de desmineralização do esmalte adjacente ao material (Sonis & Snell, 1989; Passalini *et al.*, 2010). A vantagem principal de materiais com liberação lenta de flúor é relacionada à liberação inicial do fluoreto adjacente ao bráquete ortodôntico, sendo essa a área de maior risco à desmineralização do esmalte.

CONCLUSÃO

Tomando-se as devidas precauções, é possível alcançar uma oclusão funcional e esteticamente aceitável sem deixar que a doença cárie tenha um papel coadjuvante no transcorrer e após o término do tratamento ortodôntico. Tais medidas encontram-se diretamente relacionadas à colaboração constante do paciente, uma vez que o bochecho com solução de fluoreto de sódio a 0,05% deve ser mantido durante todo o tratamento ortodôntico, bem como boas práticas de higiene bucal.

REFERÊNCIAS*

1. Ackerman MB. Selling orthodontic need: innocent business decision or guilty pleasure? J Med Ethics. 2010 May;36(5):275-8.
 2. Al Maaitah EF, Adeyemi AA, Higham SM, Pender N, Harrison JE. . Factors affecting demineralization during orthodontic treatment: a post-hoc analysis of RCT recruits. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2011; 139(2): 181-91.
 3. Banks PA, Burn A, O'Brien K. A clinical evaluation of the effectiveness of including fluoride into an orthodontic bonding adhesive. Eur J Orthod. 1997; 19(4): 391-5.
-

4. Basdra EK, Huber H, Komposch G. Fluoride released from orthodontic bonding agents alters the enamel surface and inhibits enamel demineralization in vitro. *Am J Orthod Dentofacial Orthop*. 1996; 109(5): 466-72.
5. Benson PE, Shah AA, Millett DT, Dyer F, Parkin N, Vine RS. Fluorides, orthodontics and demineralization: a systematic review. *J Orthod*. 2005; 32(2): 102-12.
6. Bertoz FA, Komatsu J, Okida RC, Mendonça MR. Ionômero de vidro como meio cimentante de bráquetes. *Ortodontia*. 1991; 24(1): 41-3.
7. Boersma JG, van der Veen MH, Lagerweij MD, Bokhout B, Prahl-Andersen B. Caries prevalence measured with QLF after treatment with fixed orthodontic appliances: influencing factors. *Caries Res*. 2005; 39(1): 41-7.
8. Buonocore MG. A simple method of increasing the adhesion of acrylic filling materials to enamel surfaces. *J Dent Res*. 1955; 34(6): 849-853.
9. Chang HS, Walsh LJ, Freer TJ. Enamel demineralization during orthodontic treatment. Aetiology and prevention. *Aust Dent J*. 1997; 42(5): 322-27.
10. Cohen WJ, Wiltshire WA, Dawes C, Lavelle CL. Long-term in vitro fluoride release and rerelease from orthodontic bonding materials containing fluoride. *Am J Orthod Dentofacial Orthop*. 2003; 124(5): 571-6.
11. Consolaro A, Consolaro MFM. Lesões cariosas incipientes e formação de cavidades durante o tratamento ortodôntico. *Rev. Clín. Ortodon. Dental Press*. 2006; 5(4): 104-11.
12. Cury JA. Uso do flúor e controle da cárie como doença. In: Baratieri LN. *Odontologia Restauradora: Fundamentos e possibilidades*. São Paulo: Santos. 2001; 31-68.
13. Darling AL. Studies of the early lesion of enamel caries with transmitted light, polarized light and radiography. Parts I and II. *Br Dent J* 1956;101:289-297,324-341.
14. Featherstone JD. The caries balance: contributing factors and early detection. *J Calif Dent Assoc*. 2003; 31(2): 129-33.
15. Featherstone JD. The continuum of dental caries – evidence for a dynamic disease process. *J Dent Res*. 2004; 83: 39-42.
16. Fejerskov O, Nyvad B, Kidd EAM. *Clinical and histological manifestation of dental caries*. Ed Blackwell Munksgaard Oxford UK. 2003; 80-6.
17. Geiger MA, Gorelick L, Gwinnett AJ, Griswold PG. T. The effect of a fluoride program on white spot formation during orthodontic treatment. *Am J Orthod Dentofacial Orthop*. 1988; 93(1): 29-37.

18. Geiger, AM, Gorelick L, Gwinnett AJ, Benson BJ. Reducing white spot lesions in orthodontic populations with fluoride rinsing. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 1992; 101 (5): 403-7.
19. Gorelick L, Geiger AM, Gwinnett AJ. Incidence of white spot formation after bonding and banding. *Am J Orthod.* 1982; 81(2): 93-8.
20. Gorton J, Featherstone JD. In vivo inhibition of demineralization around orthodontic brackets. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2003; 123(1): 10-4.
21. Heintze SD. A profilaxia individual em pacientes com aparelhos fixos: recomendações para o consultório. *Ortodontia.* 1996; 29(2): 4-15.
22. Korbmacher H, Huck L, Adam T, Kahl-Nieke B. Evaluation of an antimicrobial and fluoride-releasing self-etching primer on the shear bond strength of orthodontic brackets. *Eur J Orthod.* 2006; 28(5):457-61.
23. Kukleva MP, Shetkova DG, Beev VH. Comparative age study of the risk of demineralization during orthodontic treatment with brackets. *Folia Med (Plovdiv).* 2002; 44 (1-2): 56-9.
24. Lovrov S, Hertrich K, Hirschfelder U. Enamel demineralization during fixed orthodontic treatment - Incidence and correlation to various oral-hygiene parameters. *J Orofac Orthop.* 2007; 68(5): 353-63.
25. Lussi A, Imwinkelried S, Pitts N, Longbottom C, Reich E. Performance of a laser fluorescence system for detection of occlusal caries in vitro. *Caries Res.* 1999; 33(4):261- 6.
26. Marcusson A, Norevall LI, Persson M. White spot reduction when using glass ionomer cement for bonding in orthodontics: a longitudinal and comparative study. *Eur J Orthod.* 1997 Jun;19(3):233-42.
27. Martín IE, Corrales MC, Verdeja VE, Zaldívar LM. Factores de riesgo a caries en pacientes con aparatos ortodónticos fijos. *AMC.* 2010; 14(5):1-11.
28. Maxfield BJ, Hamdan AM, Tüfekçi E, Shroff B, Best AM, Lindauer SJ. Development of white spot lesions during orthodontic treatment: perceptions of patients, parents, orthodontists, and general dentists. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2012; 141(3): 337-44.
29. Miwa H, Miyazawa K, Goto S, Kondo T, Hasegawa A. A resin veneer for enamel protection during orthodontic treatment. *Eur J Orthod.* 2001 Dec;23(6):759-67.
30. Nalbantgil D, Oztoprak MO, Cakan DG, Bozkurt K, Arum T. Prevention of demineralization around orthodontic brackets using two different fluoride varnishes. *Eur J Dent.* 2013; 7(1): 41-7.
31. O'Reilly MM, Featherstone JDB. Demineralization and remineralization around orthodontic appliances: an in vivo study. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 1987; 92 (1): 33-40.

32. Øgaard B, Rezk-Lega F, Ruben J, Arends J. Cariostatic effect and fluoride release from a visible light-curing adhesive for bonding of orthodontic brackets. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 1992; 101 (4): 303-307.
33. Øgaard B Larsson E, Henriksson T, Birkhed D, Bishara SE. Effects of combined application of antimicrobial and fluoride varnishes in orthodontic patients. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2001; 120(1): 28-35.
34. Øgaard B. Prevalence of white spot lesions in 19-year-olds: a study on untreated and orthodontically treat persons 5 years after treatment. *Am J Orthod Dentofac Orthop.* 1989; 96(5): 423-7.
35. Øgaard B, Alm AA, Larsson E, Adolfsson U. A prospective, randomized clinical study on the effects of an amine fluoride/stannous fluoride toothpaste/mouthrinse on plaque, gingivitis and initial caries lesion development in orthodonticpatients. *Eur J Orthod.* 2006 Feb;28(1):8-12.
36. Olympio KPK, Bardal PAP, Henriques JFC, Bastos JRM. Prevention of dental caries and periodontal disease in Orthodontics: a indispensable necessity. *Rev Dent Press Ortodon Ortopedi Facial.* 2006; 11(2): 110-9.
37. Pascotto RC, Navarro MF, Capelozza Filho L, Cury JA. In vivo effect of a resin-modified glass ionomer cement on enamel demineralization around orthodontic brackets. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2004; 125(1): 36-41.
38. Passalini P, Fidalgo TKS, Caldeira EM, Gleiser R, Nojima MCG, Maia LC. Preventive effect of fluoridated orthodontic resins subjected to high cariogenic challenges. *Braz Dent J.* 2010; 21(3): 211-5.
39. Pitts NB. Modern concepts of caries measurement. *J Dent Res.* 2004; 83: 43-7.
40. Richter AE, Arruda AO, Peters MC, Sohn W. Incidence of caries lesions among patients treated with comprehensive orthodontics. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2011; 139(5): 657-64.
41. Rogers S, Chadwick B, Treasure E. Fluoride-containing orthodontic adhesives and decalcification in patients with fixed appliances: a systematic review. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2010; 138(4): 390.e1-8.
42. Rohilla M, Pandit IK, Srivastava N. Why the carioprotective potential of luting cements crucial? *J Indian Soc Pedod Prev Dent.* 2009 Oct-Dec;27(4):219-23.
43. Shannon IL. Prevention of decalcification in orthodontic patients. *J Clin Orthod.* 1981; 15(10): 694-705.

44. Sonis AL, Snell W. An evaluation of a fluoride-releasing, visible light-activated bonding system for orthodontic bracket placement. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 1989; 95(4): 306-11.
45. Sudjalim TR, Woods MG, Manton DJ. Prevention of white spot lesions in orthodontic practice: a contemporary review. *Aust Dent J.* 2006; 51(4): 284-89.
46. Tufekci E, Dixon JS, Gunsolley JC, Lindauer SJ. Prevalence of white spot lesions during orthodontic treatment with fixed appliances. *The Angle Orthodontist* 2011; 81(2): 206–10.
47. Ulkur F, Sungurtekin Ekçi E, Nalbantgil D, Sandalli N. In vitro effects of two topical varnish materials and Er:YAG laser irradiation on enamel demineralization around orthodontic brackets. *Scientific World Journal.* 2014;2014:490503.
48. Vorhies AB, Donly KJ, Staley RN, Wefel JS. Enamel demineralization adjacent to orthodontic brackets bonded with hybrid glass ionomer cements: an in vitro study. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 1998; 114(6): 668-74.
49. Zimmer B, Rottwinkel Y. Assessing patient-specific decalcification risk in fixed orthodontic treatment and its impact on prophylactic procedures. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2004; 126(3): 318-24.

CONCLUSÃO GERAL

O objetivo do tratamento ortodôntico deve ser o alcance de uma oclusão funcional e esteticamente aceitável, entretanto, deve-se impedir que a doença cárie tenha um papel coadjuvante no transcorrer e após o término do tratamento ortodôntico. Assim, medidas preventivas devem ser priorizadas, como o uso de bochecho com solução de fluoreto de sódio a 0,05%, mantido durante todo o tratamento ortodôntico, bem como boas práticas de higiene bucal.

REFERÊNCIAS

1. Consolaro A, Consolaro MFM. Lesões cariosas incipientes e formação de cavidades durante o tratamento ortodôntico. *Rev. Clín. Ortodon. Dental Press*. 2006; 5(4): 104-11.
2. Gorelick L, Geiger AM, Gwinnett AJ. Incidence of white spot formation after bonding and banding. *Am J Orthod*. 1982; 81(2): 93-8.
3. Mizrahi E. Enamel demineralization following orthodontic treatment. *Am J Orthod*. 1982; 82(1): 62-7.
4. Øgaard B. Prevalence of white spot lesions in 19-year-olds: a study on untreated and orthodontically treat persons 5 years after treatment. *Am J Orthod Dentofac Orthop*. 1989; 96(5): 423-7.
5. Øgaard B, Rezk-Lega F, Ruben J, Arends J. Cariostatic effect and fluoride release from a visible light-curing adhesive for bonding of orthodontic brackets. *Am J Orthod Dentofacial Orthop*. 1992; 101(4): 303-7.
6. Zachrisson BU, Zachrisson S. Caries incidence and oral hygiene during orthodontic treatment. *Scand J Dent Res*. 1971; 79(6): 394-401.
7. Darling AI. Studies of the early lesion of enamel caries with transmitted light, polarized light and radiography: Part II. *Br Dent J*. 1956; 101: 324-41.
8. Artun J, Brobakken BO. Prevalence of carious white spots after orthodontic treatment with multibonded appliances. *Eur J Orthod*. 1986; 8(4): 229-34.
9. Sudjalim TR, Woods MG, Manton DJ. Prevention of white spot lesions in orthodontic practice: a contemporary review. *Aust Dent J*. 2006; 51(4):284-9.

* De acordo com a norma da UNICAMP/FOP, baseadas na norma do International Committee of Medical Journal Editors – Grupo de Vancouver. Abreviatura dos periódicos em conformidade com o Medline.